

1	il laccio emostatico deve essere applicato, in caso di forte emorragia ad un braccio	31
a	al radio	
b	all'omero	
c	alla clavicola	
d	all'ulna	
2	un oggetto conficcato dovrà essere	48
a	non rimosso per evitare danni a vasi, nervi e organi e poi bloccato con un bendaggio contenitivo	
b	rimosso subito, pronti a tamponare la ferita con garze e poi bendaggio compressivo	
c	ridotto di dimensioni (tagliato) e poi rimosso prima di portare l'infortunato in ospedale	
d	se conficcato nell'addome non rimosso, se conficcato in una gamba subito estratto	
3	la parte amputata di un infortunato vivo deve essere	54
a	lavata accuratamente, immersa nel ghiaccio e inviata insieme al paziente	
b	messa in un sacchetto e consegnata alla polizia sul posto	
c	immersa direttamente in acqua ossigenata, asciugata e poi avvolta in un panno pulito	
d	avvolta in un telo sterile, messa in un sacchetto di plastica, tenuta al fresco e inviata insieme all'infortunato	
4	quale tra queste complicazioni è possibile riscontrare in un infortunato ustionato gravemente?	91
a	crisi convulsive	
b	ipertensione	
c	blocco renale	
d	vomito profuso e diarrea	
5	un bimbo rompe una bottiglia e una piccola scheggia di vetro entra in un occhio. Come interveniamo?	93
a	si estrae la scheggia con delle pinzette, possibilmente sterili	
b	bendiamo entrambi gli occhi e lo trasportiamo in ospedale	
c	bendiamo solo l'occhio ferito, lo mettiamo prono e lo trasportiamo in ospedale	
d	teniamo l'occhio aperto e facciamo scorrere dell'acqua per qualche minuto, dopo bendiamo	
6	la profondità di una ustione si misura	94
a	con la regola del nove (regola di Wallace)	
b	classificando le ustioni stesse in 1°, 2° e 3° grado	
c	misurando la temperatura corporea	
d	dipende sempre dal tipo di agente ustionante	
7	la melena è	105
a	sangue misto alle urine	
b	fuoriuscita di sangue dalla cavità uterina, lontano dal periodo mestruale	
c	fuoriuscita di sangue dalla bocca con il vomito	
d	sangue proveniente da parti del tubo digerente, di colore rosso scuro	
8	come ci si comporta in presenza di una ferita al capo con fuoriuscita di materia cerebrale?	108
a	si tampona con garze sterili imbevute di acqua ossigenata per evitare che fuoriesca altra materia cerebrale	
b	si riposiziona, fin dove possibile, la materia cerebrale fuoriuscita all'interno della ferita e si benda con una fascia	
c	si copre delicatamente con telino sterile senza comprimere	
d	raccolgo il materiale uscito e lo conservo in un contenitore sterile al fresco	
9	un oggetto conficcato dovrà essere	127
a	ridotto di dimensioni (tagliato) e poi rimosso prima di portare l'infortunato in ospedale	
b	rimosso subito con attenzione, pronti a tamponare la ferita con garze e poi bendaggio compressivo	
c	lasciato in sede, proteggere con bendaggio appropriato per evitare che si possa muovere	
d	se conficcato nell'addome subito rimosso, se conficcato nella coscia non estrarre	
10	la metrorragia è	133
a	la fuoriuscita di sangue dalla cavità uterina lontano dal periodo mestruale e non deve essere tamponata	
b	fuoriuscita di sangue durante il normale periodo mestruale	
c	fuoriuscita di sangue durante la minzione	
d	fuoriuscita di sangue immediatamente prima il normale periodo mestruale e deve essere tamponata	
11	in caso di otorragia	144
a	bisogna evitare il tamponamento poiché si può causare una grave compressione del cervello	
b	si esegue un tamponamento esterno, la fuoriuscita di sangue crea immediato e importante shock ipovolemico	
c	lavare l'orecchio con una siringa di soluzione fisiologica per vedere se ci sono danni evidenti	
d	si inserisce un tampone all'interno dell'orecchio e si sostituisce dopo un poco	
12	in caso di ustione da contatto con sostanza chimica, gli indumenti vanno tolti	155
a	sempre, anche quelli adesi alla cute	
b	no, mai	
c	si, ma solo quelli non adesi alla cute	
d	si, ma solo dopo aver spazzolato l'agente chimico ustionante	

13	come ci si comporta in caso di fuoriuscita di anse intestinali?	162
a	non riposizionare le anse, ricoprire con un telo sterile, umido, bagnato di soluzione fisiologica	
b	riposizionare all'interno della cavità addominale, e ricoprire con telo sterile, bagnato di soluzione fisiologica	
c	fasciare l'addome con ampia benda sterile assorbente	
d	bagnare con acqua ossigenata e coprire con telino isotermico	
14	durante un servizio ci tagliamo un dito mentre utilizziamo un presidio che stiamo usando per caricare un infortunato che perde sangue	165
a	si fa uscire il sangue, si lava e si disinfetta il dito con acqua corrente e betadine	
b	a fine servizio si denuncia come consueto l'episodio alla polizia	
c	appena possibile ci si reca dal proprio medico curante	
d	fare uscire il sangue, lavarsi, disinfettare, recarsi al PS per la profilassi e si denuncia il fatto al Direttore Sanitario	
15	il laccio emostatico deve essere applicato in caso di forte emorragia ad un piede	192
a	alla tibia	
b	al femore	
c	all'omero	
d	al perone	